

Tabelle 1: Überlebenszeit in den prospektiven Matched-Pair Studien zu Rektum-, Kolon-, Mamma-, Magen-, und Bronchialkarzinom – Iscador vs. Kontrolle [4-6]

Krebsart	Zahl der Patientenpaare (n)	Durchschnittliche bzw. *mediane Überlebenszeit (Jahre)		Differenz		P
		Iscador	Kontrolle	(Jahre)	(%)	
Rektumkarzinom	69	4.68	3.04	1.64	54%	0.002
Kolonkarzinom	90	6.18	4.46	1.72	39%	0.00001
Mammakarzinom (Ohne Metastasen, Ohne Lokalrezidiv)	84	11.75*	10.13*	1.46*	14%	0.0002
Mammakarzinom (Ohne Metastasen, Mit Lokalrezidiv)	29	6.08	4.44	1.64	37%	0.01
Mammakarzinom (Mit axillären Metastasen)	38	3.86	2.97	0.89	30%	0.0002
Mammakarzinom (Mit Fernmetastasen)	53	3.42	2.38	1.04	44%	0.00003
Magenkarzinom	44	2.06	1.41	0.65	46%	0.06
Nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom	52	3.08	2.60	0.48	18%	0.05
Kleinzelliges Bronchialkarzinom	21	1.99	1.44	0.55	38%	0.02
Alle	480	4.23	3.05	1.18	39%	0.00001